



# BUPRENORPHINE HAUT DOSAGE (BHD)

SUBUTEX®



# Le SUBUTEX® (BHD)



- La BHD est une molécule utilisée dans le traitement de substitution pour des patients dépendants des opiacés (héroïne, néo codion, ...)
- En 2003 en France, entre 72000 et 85000 patients sont traités par la BHD
- En 2005 on estime à 160000 le nombre d'héroïnomanes en France, la moitié est traitée par la BHD



# Que fait la BHD?

- Elle supprime l'effet de manque lors de l'arrêt de l'héroïne (*effet agoniste*)
- Elle se fixe sur les récepteurs des opiacés empêchant ceux ci de s'y mettre (*effet antagoniste*), ce qui entraîne un état de manque si la BHD est prise juste après une consommation d'héroïne ou de méthadone



# PRESENTATION de la BHD

- Elle n'existe que sous forme de comprimés sublinguaux (qui doivent fondre dans la bouche); s'ils sont avalés, ils sont inactifs et peuvent donner des vomissements.
- Trois dosages : 0,4 ; 2 et 8 milligrammes
- Boites de 7 comprimés
- Nom commercial: *Subutex*® et depuis 2005, le générique porte le nom de *Buprenorphine*
- Il existe des comprimés à 0,2 mg commercialisés sous le nom de *Temgésic*®



# Que devient la BHD?

- Après une prise sub linguale ( le comprimé doit fondre pendant 10 minutes dans la bouche), la concentration maximale dans le sang est obtenue en 20 minutes.
- Les effets durent au moins 24 heures



# Les effets indésirables de la BHD

- Constipation, mal de tête, troubles du sommeil, fatigue, nausées, vertiges, baisse de la tension artérielle, sueurs.
- Ces effets indésirables sont communs à la prise de tous les opiacés, mais beaucoup moins fréquents et moins intenses qu'avec l'héroïne.



# Où trouver la BHD?

- Chez le pharmacien qui délivrera le dosage et le nombre de comprimés prescrits par le médecin
- La délivrance est faite par fractions de 07 jours, sauf avis particulier du médecin. Cette délivrance ne peut pas excéder 28 jours en 1 seule fois
- Le patient doit consulter son médecin au moins 1 fois par mois.
- La BHD est remboursée par la sécurité sociale



# Qui prescrit la BHD?

- les médecins hospitaliers ou libéraux souhaitant prendre en charge les patients dépendants des opiacés, peuvent prescrire la BHD.

# Où se renseigner ?

- Prés de chez vous, l'hôpital, votre médecin traitant peuvent vous renseigner et vous communiquer les adresses.
- A Soissons au Point Écoute Drogues, au Point Addicto
- Auprès de la MILDT

<http://www.drogues.gouv.fr/>



# Le marché noir

- La BHD est assez souvent détournée de son usage pour être revendue au marché noir
- Des utilisations dangereuses : injection, sniff, association avec l'alcool ou d'autres produits sont fréquents, c'est dans ces cas que l'on observe les accidents: abcès, contamination par les virus du SIDA ou des hépatites, embolie pulmonaire, phlébites, décès.



# SUBOXONE

- Prochainement commercialisé le suboxone® est un mélange de BHD et de naloxone
- Pris par voie sub linguale le suboxone ® se comporte comme le Subutex ® (BHD), injecté le suboxone déclenche un effet de manque
- Le Suboxone ® est conçu pour éviter le détournement de la BHD de son rôle thérapeutique.